

Puntos Clave

Forraje de verano confiable, con BMR.
Multicorte 3 promedio.
Bueno para plantación en Verano Tardío.
Excelente para paca,
ensilaje y cosecha en verde.
Puede ser pastoreado.
Buena relación caña-hoja.

Madurez Relativa

Ciclo: Precoz
Días a Floración:

- Días a Floración: 50-55
(variable a la zona de siembra)
- Días Promedio primer corte 55-60



Posicionamiento / Manejo

QL-Minotauro, es un híbrido de sorgo forrajero enriquecido con NC o BMR Nervadura Café, los cuales se caracterizan por poseer menores contenidos de lignina que los sorgos forrajeros o graníferos tradicionales, por la presencia de genes especiales llamados genes BMR (Brown Middle Rib), lo que le confiere una mayor digestibilidad potencial a nivel ruminal.

Características Agronómicas & Fenotípicas

Potencial de Rendimiento	4
Precocidad	2
Rebrote	2
Tolerancia a Sequia	3
Semillas/Kg (x1000)	36
Germinación	3
Firmeza	3
Altura Relativa (m)	2.1-2.5

Usos Principales

Ensilaje:

Tonelaje (Forraje)	3
Calidad (Grano)	3
Picado en verde	3
Pastoreo	4
Paca	1

NOTAS:
Calificación numérica: 1 a 9 (1 = Excelente, 9 = Pobre)
Las calificaciones están basadas en la investigación de campo y observaciones de varias localidades y años.

