

### *Puntos Clave*

Forraje de verano confiable, con BMR.  
Multicorte 3 promedio.  
Bueno para plantación en Verano Tardío.  
Excelente para paca,  
ensilaje y cosecha en verde.  
Puede ser pastoreado.  
Buena relación caña-hoja.

### *Madurez Relativa*

Ciclo: Precoz

Días a Floración:

- Días a Floración: 50-55  
(variable a la zona de siembra)
- Días Promedio primer corte 55-60



### *Posicionamiento / Manejo*

**QL-Minotauro**, es un híbrido de sorgo forrajero enriquecido con NC o BMR Nervadura Café, los cuales se caracterizan por poseer menores contenidos de lignina que los sorgos forrajeros o graníferos tradicionales, por la presencia de genes especiales llamados genes BMR (Brown Middle Rib), lo que le confiere una mayor digestibilidad potencial a nivel ruminal.

### *Características Agronómicas & Fenotípicas*

Potencial de Rendimiento	4
Precocidad	2
Rebrote	2
Tolerancia a Sequia	3
Semillas/Kg (x1000)	36
Germinación	3
Firmeza	3
Altura Relativa (m)	2.1-2.5

### *Usos Principales*

Ensilaje:

Tonelaje (Forraje) 3

Calidad (Grano) 3

Picado en verde 3

Pastoreo 4

Paca 1

#### NOTAS:

Calificación numérica: 1 a 9 (1 = Excelente, 9 = Pobre)  
Las calificaciones están basadas en la investigación de campo y observaciones de varias localidades y años.

