

“USO AGRÍCOLA”

# CONTRATIZON

cimoxanil + clorotalonil

Polvo Humectable

Fungicida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>Cimoxanil:</b> 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea (Equivalente a 80 g de i.a./kg).	8.00
<b>Clorotalonil:</b> Tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 720 g de i.a./kg).	72.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Diluyente, dispersante y humectante.	20.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

No. de Registro: RSCO-MEZC-FUNG-0301J-0309-X0031-417-80.0



Tóxico si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADA”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

**CONTRATIZON** es un fungicida en mezcla de Cimoxanil y Clorotalonil formulado como polvo humectable que actúa de manera sinérgica por contacto. Es recomendado su uso en el combate y control de las plagas en los cultivos autorizados:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón,	Mildiu	<i>(Pseudoperonospora cubensis)</i>	1.5-2.5	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad



Pepino, Sandía (3)				Utilizar un volumen de agua de 550-650 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Okra, Papa, Pimiento Morrón, Tomate verde (14)	Tizón tardío	( <i>Phytophthora infestans</i> )	2-3	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad Utilizar un volumen de agua de 500-600 L de agua/ha.
<p>(<b>I</b>) <b>Intervalo de Seguridad:</b> Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  <b>Tiempo de reentrada a las zonas tratadas:</b> Después de 12 horas.</p>				

#### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Utilice el equipo de protección personal indicado en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" y realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames, para abrir la bolsa utilice un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice un corte en la bolsa a lo largo de la parte punteada. Mida la cantidad específica de **CONTRATIZON** con ayuda de una báscula. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Se sugiere agregar **CONTRATIZON** poco a poco mientras se está llenando el tanque del equipo aplicador o también mezclarlo completamente con agua en un tanque separado. Mantenga el tanque en constante agitación. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

#### CONTRAINDICACIONES:

No aplicar cuando la temperatura sea mayor de 30°C. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor de 10 km/h y a fin de evitar deriva o acarreo del producto, realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

#### FITOTOXICIDAD:

**CONTRATIZON** no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas en esta etiqueta para cada cultivo.

#### INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **CONTRATIZON** con otros productos. Sin embargo si se desea mezclar se recomienda que la mezcla se realice con los productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previas a la aplicación.

**"MANEJO DE RESISTENCIA": "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.**



## PRECAUCIÓN

